

Pflanzkartoffeln 2024



Raiffeisen-Markt

Wir leben Nähe!

Sorte	Reifegruppe	Kocheigenschaft	Fleischfarbe	Schalenfarbe	Knollenform	Empfehlung zur Pflanzung	Sorten-Info
Leyla	sehr früh	vorw. festk.	tiefgelb	gelb - glatt	langoval	vorgekeimt / Wärmestoß	beste Speisequalität, geeignet zum Folien-/Vliesanbau
Rosara	sehr früh	vorw. festk.	gelb	rot - glatt	langoval	vorgekeimt / Wärmestoß	gute Speisequalität, wenig anfällig für Krankheiten
Annabelle	sehr früh - früh	festkochend	tiefgelb	gelb - glatt	lang	vorgekeimt	sehr guter Geschmack, mit ausgezeichneter Salateignung, robust im Wachstum
Belana	früh	festkochend	gelb	gelb - glatt-genetzt	oval	vorgekeimt / Wärmestoß	premium Speisekartoffel, Lagereignung, beliebteste Salatsorte. (nicht unter 10° Bodentemp. pflanzen)
Cilena	früh	festkochend	tiefgelb	gelb - leicht genetzt	langoval	Wärmestoß	wohlschmeckende, lagerfähige Speise- Qualitätskartoffel
Princess N	früh	festkochend	tiefgelb	gelb - genetzt	rundoval	Wärmestoß	gute Lagerfähigkeit, beste Speisequalität
Agria	mittel früh	vorw. festk.	gelb	gelb - genetzt	langoval	Wärmestoß	sehr gut lagerfähige Sorte, Eignung zur Pommes-Herstellung (1-2 cm tiefer pflanzen)
Challenger	mittel früh	mehlig kochend	gelb	gelb - glatt-genetzt	langoval	Wärmestoß	sehr gute Eignung zur Pommes-Herstellung und gute Lagerfähigkeit
Granola	mittel früh	vorw. festk.	gelb	gelb - rau	rundoval	Wärmestoß	sehr gute Anpassungsfähigkeit (Boden/Klima), Langzeitlagerfähig, wenig anfällig für Krankheiten
Marabel	mittel früh	vorw. festk.	tiefgelb	gelb - glatt-genetzt	oval	Wärmestoß	gute Lagerfähigkeit (2-3 cm tiefer pflanzen)
Nicola	mittel früh	festkochend	gelb	gelb - genetzt	langoval	Wärmestoß	anspruchlos, Trockenhold, gute Salatsorte, milder Geschmack, lagerfähig (nicht unter 8°)
Ramona	mittel früh	festkochend	tiefgelb	rot - glatt	langoval	Wärmestoß	aromatischer Geschmack, sehr gute Lagereignung, premium Salatqualität

Wärmestoß: Zum Aufwecken der Keimanlagen! Kartoffeln können eine ausgeprägte Keimruhe besitzen. Es ist zu empfehlen, die Pflanzknollen wenige Tage vor dem Auspflanzen gezielt auf Temperatur zu bringen, bis ca. 18° Grad Knollentemperatur über 3 - 4 Tage.

Kleinsortierung (28-35 mm): weniger und schneller grobfallende Tochterknollen.
Normalsortierung (35-55 mm): mehr Tochterknollen von 35-60 mm.
 Der Tochterknollenansatz wird von der Witterung im Frühjahr beeinflusst.

Die Angaben zu Sorten und Anbau beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen der Züchter und Vermehrer. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden.

Tipps für erfolgreichen Kartoffelanbau



Raiffeisen-Markt

Wir leben Nähe!



Boden und pH-Wert:

pH-Wert: 6,0

Durchlässiger Boden, moderater Humusanteil



Keimung:

5-7 Wochen bei 8-12 °C + Licht
Stabile Lichtkeime von
0,2-0,5 cm anstreben



Ernteverfrühung:

Lochfolie oder Vlies im Damm
für 14-21 Tage Verfrühungseffekt



Düngung:

Verhältnis 1:1:5:2 (N:P:K:Mg)

Vor der Pflanzung: Kalimagnesia
17/10 oder ähnlich



Pflanzung:

Tiefe: Doppelte Kartoffellänge
Abstand: Drillinge 18-20 cm,
Normalsortierung 30-32 cm



Bewässerung:

3 x wässern: Anfang, Mitte und
Ende der Blüte
Max. 25 mm/m² je Bewässerung



Pflanzenschutz:

Spritzschutz gegen Phytophthora
(Kraut- & Braunfäule) in
Krautzuwachsphase



Abreife und Ernte:

Reif bei Gelbfärbung der Blätter
Festkochende Sorten ändern
Kocheigenschaft danach



Krankheiten:

Schorf vermeiden: Kein zu hoher
pH-Wert, kein freies Wasser im
Damm, keine Lufteinschüsse